

Аконит борец

Автор: manager
10.09.2012 20:29 -



Аконит или Борец название одного и того же вида растения, которое принадлежит к семейству Лютиковых и насчитывает около 300 видов.

Эти многолетние травянистые и очень ядовитые растения широко распространены в Северной Америке, Европе и Азии.

В основном виды имеют прямостоячие стебли, высота которых может варьироваться от пятидесяти до ста пятидесяти сантиметров, но встречаются и вьющие сорта, длина стеблей которых может достигать четырехсот сантиметров.



Наиболее популярным является аконит клубочковый или борец синий. Он произрастает практически на всей территории Европы и его довольно часто делят на местные виды.

В Альпах выделяют аконит плотный, а в Карпатах аконит низкий и аконит твердый. Большая изменчивость этого вида часто служит причиной путаницы в названиях этого растения. Не добавляются ясности и другие виды, введенные недавно в культуру. Это аконит пестрый, который занимает промежуточное звено между аконитом метельчатым и аконитом клубочковым.

На Дальнем Востоке довольно часто встречается аконит Фишера, который растет в смешанных прибрежных и лиственных лесах. Чаще всего его можно встретить в ольховниках, березовиках и на прогалинах.

Аконит Фишера это многолетнее травянистое растение, высота которого может варьироваться от ста до ста шестидесяти сантиметров. Листья плотные, иногда кожистые пальчатонадрезанные на несколько долей. Верхушки побегов заканчиваются соцветием – ветвистая кисть, окраска цветов чаще всего синяя, но иногда может встречаться и белая.

В европейской части нашей страны, в горах Средней Азии и на юге Сибири довольно часто встречается в диком виде аконит высокий. Это многолетнее растение может достигать высоты около двух метров. Стебли толстые, бороздчатые, покрыты длинными волосками.

Листья пяти- или семирассеченные, ромбические. Цветки окрашены в серовато – фиолетовый или грязно - фиолетовый оттенок. Соцветие простая кисть находится на верхушке побега, ее длина может достигать пятидесяти сантиметров. Цветение происходит в июне – июле, а семена созревают в августе – сентябре.

Мелкие трехгранные семена находятся в многосемянных листовках. Один побег с цветущей кистью может дать до 1800 семян. У взрослых растений в результате отмирания старых корневых клубней наблюдается деление молодых частей растения на отдельные участки. В результате этого вместо одного старого взрослого растения появляется несколько молодых.

Аконит борец

Автор: manager
10.09.2012 20:29 -

